

preskočiti, a debljine najmanje 6 cm do 8 cm. Kao dezbarijere za dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve prelivene otopinom dezinficijensa. Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji, pa su prikladne hlorne otopine jače koncentracije npr. 0,5 % Na-hipoklorit (izbjeljivač koji se može naći u domaćinstvu razrijeđen 1:10). Za održavanje dezbarijere zadužena je spremačica. Dezbarijeru svakih 3 sata prati i ponovno natapati s dezinfekcijskom otopinom ili u skladu sa dinamikom ulazaka unutar prostora Univerziteta u Sarajevu.

Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkrivenog prostora nakon svake kiše moraju se prelići novom količinom dezinfekcione otopine. Obavezno dodijeliti za svaki zadatak jednu odgovornu osobu.

Za sve mjere propisane ovom uputom potrebno je voditi evidencije.

Upute za studente

Prilikom dolaska studenata radi obavljanja praktične nastave ili polaganja ispita potrebno je pridržavati se osnovnih mjera prevencije nastanka i širenja oboljenja COVID 19 (nošenje zaštitne opreme, održavanje fizičke distance, dezinfekcija ruku, dezinfekcija obuće pri ulasku).

Preporuka je da svaki student ispuni obrazac kojim izjavljuje da je zdrav, da nema temperaturu niti respiratorne simptome, da nije u samoizolaciji i da nije imao kontakt sa osobom koja je sumnjiva ili pozitivna na SARSCoV 2.

Prije ulaska studenata u učionice, laboratorije, prostorije za obavljanje praktične nastave ili u prostorije za polaganje ispita preporučuje se pranje i dezinfekcija ruku i održavanje fizičke distance u svim smjerovima, uz obaveznu upotrebu maski za lice.

Testiranje na SARS-COV-2 se radi isključivo po medicinsko-epidemiološkim indikacijama po **Protokolu testiranja na COVID-19/SARS-CoV-2**. tako da uposlenici i studenti Univerziteta u Sarajevu ne zahtjevaju rutinsko testiranje.